


Purina

PROGRAMME POUR PETITS ÉLEVAGES



**\* PRODUITS DE REMPLACEMENT**  
LES CLIENTS DU QUÉBEC ONT BESOIN D'UNE PRESCRIPTION POUR LES PRODUITS MÉDICAMENTEUX.

Médicamenteux	Non Médicamenteux
6039	6038
6055	6054
8016	8070
6039	8071

\*MP : Médicamenteux avec Amprolium

La durée d'alimentation et la quantité totale d'aliments consommés sera relative aux objectifs de poids. Il est recommandé de passer à PURINATURE GROWENA COMPRIMÉS à 5 semaines. Par contre le changement peut se faire plus tôt (4 semaines) ou au plus tard (6 semaines).

NOTE : La quantité de mouleée consommée peut varier selon le statut sanitaire, la génétique, les pratiques d'alimentation et la régie.

Tableau de consommation de PURINATURE	0 à 4 sem.	4 à 8 sem.	8 à 10 sem.	10 à 14 sem.	14 à 18 sem.	18 sem. et +
<b>POUSSINS</b>	2 kg	4 kg	4 kg et +			
(Avec 6054-6055)	6 kg	4 kg et +				
<b>DINDES</b>	3 kg	5 kg	11 kg			
<b>PONDEUSES</b>	3 kg		6 kg			

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULETS À GRILLER/RÔTIR**  
Les poussins doivent être alimentés à libre choix et avoir à leur disposition des aliments frais en tout temps. Lorsqu'ils ont atteint 5 semaines d'âge, doubler l'aire d'alimentation et d'abreuvement.

**NOTE:** Les poulets à griller sont habituellement abattus au poids de 2 kg (4.4 lbs) alors que les poulets à rôtir peuvent être abattus à un poids de 3.5 kg (8 lbs). Les poulettes sont habituellement plus petites et plus légères que les jeunes coqs du même âge.

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR DINDES**  
Placer une tubulure pour chaque groupe de 10-12 dindes. Pour l'utilisation d'auges, une longueur de 20 cm (8 po) est requise par oiseau. Les dindonneaux doivent avoir un accès facile à l'alimentation durant leur première semaine d'âge. Les cartons d'œufs sont un excellent moyen d'alimenter les jeunes. De l'eau propre et fraîche à libre choix doit être à la disposition des oiseaux en tout temps. À l'âge de 6 semaines, augmenter l'espace de plancher à 0.5 m (5 pi) par oiseau et doubler l'aire d'alimentation et d'abreuvement.

**NOTE :** les dindes vont atteindre un poids de 5 kg (11 lbs) à l'âge de 14 semaines mais les dindons peuvent atteindre plus de 13 kg (29 lbs) en 25 semaines. Les femelles sont généralement plus petites au même âge.

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULES PONDEUSES**  
Les oiseaux doivent être alimentés à libre choix en tout temps, et de l'eau fraîche à la température de la pièce doit toujours être à leur disposition. Après 20 semaines, l'aire d'alimentation et d'abreuvement doit être d'une tubulure par groupe de 10-15 poules ou encore une largeur de 10 cm (4 po) par poule. Un nid devrait être disponible par 5 à 7 poules. Une luminosité supplémentaire doit être apportée. De plus, assurez-vous que les poules reçoivent entre 14 et 17 heures de lumière continue par jour afin de rester en production. Si les lumières sont allumées à 6h00 am, la plupart des poules vont avoir pondu leurs œufs pour 11 h am. Une chaleur supplémentaire doit être apportée lorsque la température est plus basse que 15°C (60°F) afin de maintenir la production d'œufs.

	Protéine	Gras	Fibre	Na	Ca	P
6032	15%	2,0%	6,0%	0,16%	0,85%	0,70%
6038	20%	4,0%	4,5%	0,18%	1,00%	0,75%
6039	20%	4,0%	4,5%	0,18%	1,00%	0,75%
6054	18%	3,0%	5,0%	0,16%	0,90%	0,70%
6498/6498 «L»	17%	1,5%	4,5%	0,16%	3,80%	0,60%
8016	24%	3,0%	6,0%	0,15%	1,30%	0,90%
8036	20%	6,0%	6,0%	0,15%	1,10%	0,85%
8070	25%	2,0%	6,0%	0,15%	1,30%	0,90%
8071	20%	2,0%	6,0%	0,16%	1,00%	0,80%

multipurina.ca

Pour plus d'information, veuillez contacter votre concessionnaire Purina local : 1-450-676-8607, purina\_retail@cargill.com ou visitez notre site Internet.



PURINA®

POUR LEUR BIEN-ÊTRE



CONSEILS PRATIQUES POUR L'ÉLEVAGE DE VOLAILLES DE BASSE-COUR



2017

multipurina.ca

PURINA® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare

## INTRODUCTION

Ce dépliant a été conçu pour vous fournir des informations utiles concernant le démarrage et les soins à donner aux poussins, poulettes et volailles, particulièrement à l'arrivée des poussins. Avant toute chose, il faut se rendre compte que les poussins sont des « bébés » et de ce fait, il faut les traiter avec beaucoup d'attention. Évitez de les manipuler ou de les faire sursauter inutilement. Assurez-vous qu'ils ont l'espace et la chaleur dont ils ont besoin. Essayez de garder les animaux et leur environnement propres et exempts de parasites et de maladies. Votre distributeur Purina peut vous offrir tout ce qu'il vous faut pour élever vos volailles avec succès.


## DÉMARRAGE ET SOINS DES POUSSINS, POULETTES ET VOLAILLES

**Préparatifs :** Les installations doivent être bien préparées à l'avance de l'arrivée des poussins, tout retard aura une incidence sur la performance. 24 à 48 heures avant l'arrivée des poussins, nettoyez, désinfectez et asséchez les unités de démarrage et l'équipement. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un désinfectant reconnu. L'unité de démarrage devrait préférentiellement être circulaire pour éviter que les poussins s'égarer dans les coins. Recouvrez l'unité et l'espace autour avec 8 à 20 cm de litière fraîche. Suspendez un thermomètre à 5 cm du sol pour pouvoir vérifier la température. Avant de placer les poussins dans l'unité de démarrage, amenez la température de l'enclos entre 30 et 31°C.

## AMÉNAGEMENT

L'aménagement idéal doit comprendre assez de mangeoire et d'abreuvoirs pour tous les poussins. Il faut remplir les abreuvoirs plusieurs heures avant la livraison pour élever la température de l'eau à environ 18 degrés ou utiliser de l'eau à température ambiante. Un tube par lot de 25 oiseaux ou, si vous utilisez une auge, 5 cm par oiseau. Un espace de 2 cm par poussin pour boire s'il s'agit d'une auge à eau ou d'un abreuvoir en cône de 5 litres pour un maximum de 100 poussins. À l'arrivée des poussins, prévoyez environ 0,25 m<sup>2</sup> par lot de 10 oiseaux. Augmentez progressivement la grandeur de l'unité après approximativement une semaine et enlevez la clôture après 7 à 10 jours.

### AMÉNAGEMENT IDÉAL/100 OISEAUX



## L'ARRIVÉE DES POUSSINS

Assurez-vous que toutes les mangeoires sont pleines. Nourrissez toujours les poussins « à volonté ». Les poussins doivent toujours avoir de l'eau fraîche et propre « à volonté ». Il est important de conserver une température uniforme dans l'unité de démarrage. Le tableau ci-dessous indique les températures idéales de la distribution de la chaleur des éleveuses

TEMPÉRATURE DE L'ÉLEVEUSE			
Âge (j)	°C	Âge (j)	°C
1-7	32	22-28	26
8-14	30	29-35	24
15-21	28	36-Abattage	21


Une éleveuse ou des lampes infrarouges (1 lampe/50 poussins), placées à environ 50 cm au-dessus des poussins devraient produire une chaleur suffisante.

## VOUS DEVEZ PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CE QUI SUIT:


Vérification quotidienne:

- Répartition des oiseaux dans les enclos;
- La température et l'humidité, la ventilation, la moulée et de l'eau, l'éclairage, la litière, l'état de santé et des changements mineurs dans le comportement;
- Garder le gabarit de la température de l'éleveuse.


## GUIDE DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR




**DISTRIBUTION UNIFORME**  
Les poussins occupent tout l'espace autour de l'éleveuse ce qui indique que la température est adéquate.



**TROP CHAUD**  
Les poussins s'éloignent de la source de chaleur et ont tendance à somnoler.



**TROP FROID**  
Les poussins s'entassent sous l'éleveuse.



**COURANT D'AIR**  
Les poussins s'entassent derrière l'éleveuse.

**-Gold'N-**  
NON MÉDICAMENTÉ

FORMULÉ AVEC PROTÉINES ET MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES SEULEMENT



	6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6051 GOLD'N Moisson Concassé <i>Le poids d'abattage peut être atteint plus tôt</i>																OPTIONS POUR GOLD'N LAYENA		
	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	Produit	Région	
POULETS À RÔTIR/GRILLER	6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6051 GOLD'N Moisson Concassé																		
DINDES	8070 GOLD'N Dindes Startena Concassé		8071 GOLD'N Dindes Growena Comprimés		6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6051 GOLD'N Moisson Concassé														
CANARDS ET OIES (VIANDE)	6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6051 GOLD'N Moisson Concassé																		
CANARDS ET OIES (PONTE)	6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6058 GOLD'N Growena Comprimés		60585 GOLD'N Growena Texturé															6490 GOLD'N Layena «O» Concassé	6025/6495/6497/6497 GOLD'N Layena
PONDEUSES	6040 GOLD'N Début et Croissance Concassé		6058 GOLD'N Growena Comprimés		60585 GOLD'N Growena Texturé															6490 GOLD'N Layena «O» Concassé	6025/6495/6497/6497 GOLD'N Layena

La durée d'alimentation et la quantité totale d'aliments consommés sera relative aux objectifs de poids. Il est recommandé de passer à GOLD'N CROISSANCE-FINITION VOLAILLES à 5 semaines. Par contre le changement peut se faire plus tôt (4 sem.) ou au plus tard (6 sem.)

NOTE : La quantité de moulée consommée peut varier selon le statut sanitaire, la génétique, les pratiques d'alimentation et la régie.

Tableau de consommation GOLD'N	0 à 4 sem.		4 à 8 sem.		8 à 10 sem.		10 à 14 sem.		14 à 18 sem.		18 sem. et +	
	Poussins (Avec 6040-6058)	Dindes	Canards et Oies (Viande)	Canards et Oies (Ponte)	Pondeuses							
	2 kg	3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3 kg							
		6 kg	5 kg	4 kg	4 kg							
			4 kg	4 kg	6 kg							

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULETS À GRILLER/RÔTIR**  
Les poussins doivent être alimentés à libre choix et avoir à leur disposition des aliments frais en tout temps. Lorsqu'ils ont atteint 5 semaines d'âge, doubler l'aire d'alimentation et d'abreuvement. **NOTE :** Les poulets à griller sont habituellement abattus au poids de 2 kg (4,4 lbs) alors que les poulets à rôtir peuvent être abattus à un poids de 3,5 kg (8 lbs). Les poulettes sont habituellement plus petites et plus légères que les jeunes coqs du même âge.

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR DINDES**  
Placer une tubulure pour chaque groupe de 10-12 dindes. Pour l'utilisation d'auges, une longueur de 20 cm (8 po) est requise par oiseau. Les dindonneaux doivent avoir un accès facile à l'alimentation durant leur première semaine d'âge. Les cartons d'œufs sont un excellent moyen pour alimenter les jeunes. De l'eau propre et fraîche doit être à la disposition des oiseaux à libre choix et en tout temps. À l'âge de 6 semaines, augmenter l'espace de plancher à 0,5 m<sup>2</sup> (5 pi<sup>2</sup>) par oiseau et doubler l'aire d'alimentation et d'abreuvement. **NOTE :** les dindes vont atteindre un poids de 5 kg (11 lbs) à l'âge de 14 semaines mais les dindons peuvent atteindre plus de 13 kg (29 lbs) en 25 semaines. Les femelles sont généralement plus petites au même âge.

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULES PONDEUSES**  
Les oiseaux doivent être alimentés à libre choix en tout temps, et de l'eau fraîche à la température de la pièce doit toujours être à leur disposition. Après 20 semaines, l'aire d'alimentation et d'abreuvement doit être augmentée à une tubulure par groupe de 10-15 poules ou encore une largeur de 10 cm (4 po) par poule. Un nid devrait être disponible par 5 à 7 poules. Une luminosité supplémentaire doit être apportée. De plus, assurez-vous que les poules reçoivent entre 14 et 17 heures de lumière continue par jour afin de rester en production. Si les lumières sont allumées à 6 h, la plupart des poules vont avoir pondu leurs œufs pour 11 h. Une chaleur supplémentaire doit être apportée lorsque la température est plus basse que 15°C (60°F) afin de maintenir la production d'œufs.

**PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR CANARDS ET OIES**  
De l'eau propre et fraîche doit être à la disposition des oiseaux en tout temps. Assurez-vous de placer une tubulure pour 25 canards et une pour 10-12 oies. Pour l'utilisation d'auges, 5 cm (2 po) sont requis par canard et 20 cm (8 po) par oie.

	ANALYSE GARANTIE					
	Protéine	Gras	Fibre	Na	Ca	P
6025	17%	1,5%	4,5%	0,16%	3,80%	0,60%
6040	20%	3,0%	5,0%	0,16%	0,85%	0,70%
6051	18%	3,0%	5,0%	0,16%	1,0%	0,70%
6058	15%	2,0%	6,0%	0,16%	0,85%	0,70%
60585	15%	2,0%	6,0%	0,16%	0,85%	0,70%
6490	17%	2,0%	4,5%	0,15%	3,80%	0,60%
6495	17%	1,5%	4,5%	0,16%	3,80%	0,60%
6497	17%	1,5%	4,5%	0,16%	3,80%	0,60%
64975	17%	1,5%	4,5%	0,16%	3,80%	0,60%
8070	25%	2,0%	6,0%	0,15%	1,30%	0,90%
8071	20%	2,0%	6,0%	0,16%	1,10%	0,80%

**multipurina.ca**  
Pour plus d'information, veuillez contacter votre concessionnaire Purina local : 1-450-676-8607, purina\_retail@carill.com ou visitez notre site Internet.